痧

脹

玉

衡

書

寒即散其毒於肌膚 血肉之表為腫為脹若誤飲熱唇即散其毒於肌膚 血肉之表為腫為脹若誤飲熱唇進沉重不省人事若元氣壯實內不受那不入於亦者暑熱時沒惡声之氣攻於寒則為痰喘為血疹 一 翰黄 聞 儿 一 姆 久 生 磨 忠 腹 治验 楊李郭志遂右 大如殿手足俱順。

|汧 乃 延 慢症 舊o寶. 黑毒 余 可 作 小治其珍毒人 於人 腫 成就 也 作脹 儿 長女 其 脉 加 桃. 脲 微 手足 1-注。其 必 无 然 紅 腿 脉 右 木 愈灣微洪 俱 花 腫消 湯 以有 入 刺 右 述 服の指 脉歇 **彩筋市色刺** 力。敬 が腹 服 以为 梭 指っ見 平 腫 脉 脈 脤 症 俱 相 針o針o合o對

科冷不 又源○心 劑o之 出o治c能!

洪 故 腫 偷 脹 於熱湯 公消實兩寸 紅色頭汗水群的姓者 株が心臓 姓者。 海 極氣 如 有 藥遂已後至二月餘 八內攻壅塞衙、及看其痧筋了 以外不絕求余於親西外子四歲頭面胸腹玉 此 信 **%食之迹感** 心成現 鬼? 刮 頭 手足術 徧 彩 ाणि 兩 化 , 那不起 身作 闊 而爲 啊 腫 尺。身。 此 羅り

那藥施治如發量不醒扶之不能 服藥施治如發量不醒扶之不能 那藥施治如發量不醒扶之不能 那藥施治如發量不醒扶之不能 是 為調治 | 在君美內室六日 八月間本 **胚然後状起放形** 形起必須審除錯死 下風人不知覺即時 延余於之兩寸

ら之症。 昏然 湯。用 楊·氣 落马驱 湖香河流春香 香阿魏九 热心此 述 指 腱口 翍 難 或 ·藏必須 來 喘不 燥 但重核之時見敬指此一抵之不起先用實花出一大之不起先用實花出一種 如。須 香 1,0 後治療 服 目 之。症。上 的形。 是 形 班 如 毒小見 四不薄 其 落 物愈。荷碱

夢部の一 散艺 付ってって 右條陳施州。於延寸然及湯。作下及 浮 松中儿此野山 四犯左中子稍 去 之。尺後而冷紫 腎沉渴o痊o下c黑 花 又毒 故。醒。 細。煎 之動滚沙止茶 一川 血。加 伤用砂

病其上默 大 醒。易。行 肺、升。默 所腎阻不禁妳然入干 理形同族而一族 為喉形 要開如 上日 加 壅 然 塞 亞 後。章 盛 抄 便 而 魚飲養清之。暈 推 然っ此 詳治乃 徐宜源 用更也。 雜. 先 補進用 之放壅. 中圓獨 脉。其 盛。 益紅活 期疹。熱 氣 散 紅 知 審 濺 湯。而 花

有所左流一是壽。故有語。子 長朴 注。症 **上**種間 頂阻米有力子心於愈此右瑞 未有力于瑞

無 脹。症。痰 滕心 腑 **账** 延 撲 喉喉有喉 治的項 间 上。 此而可不 形 如角弓反 辨 移。無 110 也。若條 莎o鴉·唉 之 張。 是

孙 秘 信。一 脹 從 用 沉 一 之。 市原 傷 飲 周 雅 香 銀 多 服 養 形 原 風 務 企 學 怪 先 於多怪異此三焦命門之彩與高凶暴痛極余診 電金散放告丹清茶於飲之三劑而痊 生疾痛之極疾延壅盛延余余日務也不 生疾痛之極疾延壅盛延余余日務也不 生疾痛之極疾延壅盛延余余日務也不 少至夕而殂 包感。嗽 囚 莎 而咳 敷。 肺經受傷不可 傷 治

力的 症。風。當 和北西海海 其源 脉 一 浮 **徐** 盎 <u></u>
恋属 止。弟 為而茂 之礼。公 成o痧 先。以 (慎之慎之) 射干鬼放移利 放 徐傷 宜 疏 趂 脈 風 風 B 主。 湯の稍 氣 咳. 可。力。順 欢京疹 脖 微 肺則 氛 災發 北。散 純 纒 旅 肵 縮 感の熱の B 不主。刷 肺 診之。 已。若 雜 非 劳取重 月之之 重 と○敷□ 也のす 等 疏

虚隐者

煽。四 延 放戰 新原 不 有 为 是 别 子 則 係の紫 痘. 自 起 ·人事" 刑 梗 、腿巻を 之低也 积炭 胍 針 刺 脹 叫 出 也 熱 丹紫筋兩條介日西熱如塩而有隱隱 餐~但 如熱物 毒 熱く 隐 徽 是 ·疾喘氣急 い門痘之 随 宜 先放 东 用 急四 荆 以事後 形 徐 連 也。兩 肢 採L 瓠 戦 腿 紫 灣 震 肋 動。 無 細 崇 神o點o兩 如

五断書之二十五朝忽然叫赋不已發 切丹展子七歲八月出痘脫痂光溶飲 兒 如致所兒斯兒斯兒 胸腹腹 量 食 如 欲 妖5常で

稍冷飲之即姓後日出紫黑毒血不愈用後細而伏若此脈症 皆 微 張 香 細 當師 而 休 。 惡 能轉側延余診治可久女十五歲痘 一线洗 山查 糸 四來後小腹痛變為痢疾用 如不能用期於跟者就養人物 《大黄五" [[[蔵の剤 外。腹利 加 右脈 後三十二 便 微温 炯。 飲之 科 治 婦 和 沉 忽 歷 歷 宣 图 繁 大。發量 化 指。力。部。 銭の飲い刺 个

服稜术湯加明誓二分微冷飲之而安。香丸微温服而產後傷食為穢氣所觸腹痛刮。降香桃花散合枳實大黃湯稍冷飲之不愈用歌指視其指頭黑色青魚歷歷利出赤血不愈

症》 油 一趟方亨內完 誤 鹽 疾 別 至 本 者 應c余c 去游毒横行時一 験 建攻廠急 腑莫可挽回慎母草草宜利被肌膚痧攤尤重

養血乃 ·安 後 用 胡湯退熱又參本節地律

反處治之方理 任 地·克伐·然 穩 查 當 查 荆 芥防 產 藥。後 及思於胎有害此子所以后然那毒勢盛此等之樂難於強 一神麴麥芽寬中而不伐胎此 如風獨活細辛透竅而不食胎此 以及紫朴砂仁乌樂行氣而不 痧 毋須痛 温 謫 産 煖o 後。施 脹 用 薬。 媛 惟 亦 重 反速性。胎不 消 而或 擇 權於食氣用中。債。散 不權 敬

陳 苑 。其 淌 也。滞。所 恋 趣 而不症。麥皮。用 僚 愚骨 平樂 形產 御以 形 山 用 臨 氲. 而後以清 用之通熱 脹分積後禁。神藥散同

其之氣。者別 症。脹 露 宜氣。則益朋 至便以清 新五条 有今之產 余 婦 熱遊放 此腹婦腹 產級腹中 瘀っ若 臨 痛 痛。絞 兼具背痛。 常。在 脹。 後更惟 小大地の座腹の如當婦子 小 大 症○極○微 婦 大 臌 俱 微 取本腹惡 得温之

之、放 甦い余 迨 腿 悶 治。) 痧毒 爲 十指筋 胸 刈っ瘸 疲六 即中 軒 前 内 脹 全。蓋。針。刺 벎 垂 紁 產 脹 111 Ľ 游 危。後 救o去 危o後 南 盡o延 八 紫黑 筋 痛 稍 建血 余。日 の止っ定。毒 何 惡用 í Í 先取 脈 惡 落 派 洪 獨 --大 重 俱活 通紅花 **M**. 便 _m_ 此 信 過 針。 脈。倫。 多湖忽補 言。 湯。然 後 之。復 扶

微 悶 單 o金 刺 惟 駅 指 紫 銀 微 温 一 常。公 花 色省二 色。延 廉 _lm. 服 丹 版之寒 紫黑毒 内 余。 室寒 六 正 脈 **ル** 兼 時 が之 後 彰. 鱼三十 底 脹 有 (L) /\ 盂 下 华. 悶 柴黑 症。敬 月 俱 膝刺 指 渔 除 石 Me 此余復診之不行 莿 體 後 指 閱 斛 涔 上左 鳥 Ú. 調 崇 4 痛の補 樂 桁o寒 ifi 1] 凯 蒜 愈。查 紃 存 洪大 加雅。 平 煉 無 _M_ 柴 皮 七名 の針の指の唇 15

夢毒交壞嚴騙者不治 腫脹臥牀不能轉側者是也肚腹不痛亦為暗痧若 經行之際適遇痧發經阻逆行或鼻紅或吐紅肚腹 寒熱乃。如 弘 先内人經 廖問問月餘而健 中文柴胡獨活也灰牛勝山空温服 前看問俱除但寒熱未已用立感花 期發熱鼻瓜 如注。 重(肚

先 度 旗 在 旗 旗 仁 調理而愈仁紅花獨活 訓 从那 則 腿灣 二針 版延 余 診之 脈伏 刺 網等山查香附青皮。腿灣二針出紫思毒 介 日 兼 羽 · 種重症。温飲即 (飲即慢音) 於用轉發 ·加重便飲之 血不愈余 慢 發熱或 を亦選級の熱の納 桃

・ 大陸・大夏月日晚餐熟五日不凉路樂不效友益昏問煩躁余診之右三部及左關俱後細無力祭見其病氣有餘脈反若不足知非真不足乃疹殊見其病氣有餘脈反若不足知非真不足乃疹紫黑毒 血三十餘針不愈用冷蒸送實花散二服火以陳皮厚朴湯主之倍加玄胡索香間煎湯有以及以陳皮厚朴湯主之倍加玄胡索香間煎湯有以及以陳皮厚朴湯主之倍加玄胡索香間煎湯有以及以陳皮厚朴湯主之倍加玄胡索香間煎湯有以及以陳皮厚朴湯主之倍加玄胡索香門煎湯有 同或有可疑須看班筋有無辨之即明脈浮數而緊熱症之脈洪數有力症症之脈終 鼢

愈煎紫科陽稍冷服三劑病風已聚愈煎紫科陽稍冷服三劑病湯温飲下其愈煎湯温飲下其一。 故知其症刺出十指紫 而·身原 根實 複 愈動 一 那 常 常 常 冷服。 原發一般語延余左原俱後衛之事是月衛熱往來已六 潮 前 室の変の日 一機の 炒紙已盡用大黄三錢 似然已盡用大黄三錢 以石脉 供此大 小地黄丸調 余の

之 日漸調理半月而痊 毒血不愈用桃仁澤蘭等分前 脈不若是之異也視其乳下指 月服熱酒熱湯熱物雖非縣然緊急勢必日漸凶類輕而且淺人多誤以心煩暗腫治之日甚一日氣衝於心胸故心煩或嗜睡此等之亦俱属慢症氣煩煩症腫 故併錄之以示戒。 一服神情始定一條利出紫黑

學服主德書
大有痰水咳嗽之疾忽爾端急炎

一王培元適會於其弟宋臣書
已非一日將服他藥余診之脈。

配一以為例
一余弟縣武每心煩階雕自識

一条弟縣武每心煩階雕自識
一老弱兼彩

老弱兼彩
老弱兼彩 而在此等彩甚多站外在不合止而不服 177 忠。其 心難輕之至不足

盛 篤。汗 然後 是一三年 有如雀啄雖老弱歌然作發表 然視其縣然作發表 一汪子建母七旬在 者。往 後漸補氣血則標本兼得其理者有凡治必宜紹納察縣族症先達在往有之然亦有兼感時氣或如如油喘而不休心胸煩悶矣可以 治 駁 異。旅。錯。犯余 普 延 痰 有歌指小 有 **派** 脈 難 云 北 兼 死 c 其 然 然 心心 怪の幻の瘀

浙 若竟以 俱庫。 一盛君 叉 所 龍如 能先病勢漸安後惟補其氣魚如注先用散彩消食豁痰順氣 如性先用散彩消食豁痰順氣 宜然 與症 絲筋。痰 () 大多 驗。終 為身 筋二 児 施·俱 疑 然 膧 視 6年 9 血 c氣 之限也及按其E 余思老年族火田 際之 乃之 條 痊o劑o刺 赤頭汗 併進牛黄 為 渦 小い脈の固 流

世界多可畏處況於楊縣多洪數兼亦派 所和後常服實花散面赤頭片身腫俱為 所和緩唯是老弱埃火為終身之疾 所和緩唯是老弱埃火為終身之疾 腫痛必多可畏處況於獨放火盛而膿腫作痛 是一方。 一種病必漸漸而極非若兼亦之縣故凡於湯 腫痛必多可畏處況於楊縣多共盛而膿腫作痛 冶 驗 與作身腫俱除喘急亦一十餘針去其毒血次 派固不 湯痛。 兼恋農 同。其格

膿 瓬 頂 余 劑 > 膿 膿 瘡 消 心 日。更 瘡 瘡 疝 覺 腫 大 俱 书. 豚 到一不 痛。盛。亮 愈。之 昏 咏 꺠 逃 或 女! 当 由 症。鲍斯 檑 以 四 劑。方 必問。而 其 歲思蒼 微始症延極。酒 冷 使介治助 满 飲 爽。然。治 以 血 刺之。京 热。已 之。但 兼胸 脈 _FI. _liff. 食 外 F 献。 指 不 活 111 頭洪 鷄 飽 襟 _íıı. 問。毒 數 解 合 鵝 学 於 声 血。而)[] 九。順又反托毒飲 之 飽 朝 纁 沉 裏 酒 微。之 味。後。 悶 散頭

旁弱未見凶危症滿已在目前兵 題以称為主治之令珍毒退盡方可治其本症不然 惡之氣相犯必兼發脹或多淡喘或咽喉如睡或心 應服問煩躁發熱較之平時不足之症益覺沉重此 是口解紅或骨蒸發熱不已一觸犯時氣傳染或穢 先有勞弱不足之症或此血時發或微微乾嗽兩觀 宜 婦 江川 人 驗 世 重。血 里他憐以為怒氣血虚出的軟畫京夜熟已久如 用養血 化炭 發熱 駅. 然。此心 穢

沂 看 内 氣。微 是長周沉重之勢但等 他勝有紫筋數條歷歷 上中二部亦當見花何 大放昏逃痰喘先刺其空 大放昏逃痰喘先刺其空 大放昏逃疼喘先刺其空 大放昏逃疼喘先刺其空 大放昏逃疼喘鬼 愈。進 門指其為狼務 旅不到海海 原不 残不 不匀余的 足。復 余。 之是。數。怒

愈肺卒肺 32 加 群 肝

始o一 日可 病 英谷其終若 · 沒無亦 之。成 而 一 愈い筋の餘

日服治版香港五針俱和北海大學青衛五針俱和北海大學青衛五針俱 也亡診 之。江 變嚴 也慢 舠 实 為 脹 ML 臌 腹 1 脹 · 無症無病 原素症無疑。 原素症無疑。 原素症無疑。 一月餘殿症盡不示 前是後別殿症之世 症の急 其指 嚴。 脐 血略熱 黑色的青 略影 ·永不復發 《與導去惡· 《照義素教》 臌 餘 心 腸 針:症 口 将平c 胃血 水口微 余

發。漸上 爱姑誌之以例如 一声筋即淡色的 治験 (不復用 及用樂施治但恐其根末除之人多又刺指頭出毒血一人也多又刺指頭出毒血一 郇 慢疹 急作 成以 脹 四但恐其根未除四個頭出毒血二十四個頭出毒血二十四 也。腹 飽 刺腿灣青筋 悶c 臍 版 四 針o六 腹 脹臍

遂。於.也。心》 有變症 丰 沿 痧 難 左。者。入 愈 矣。治。其遺鄉寿。害 為衛 が 吐血の 华、激 延活也身 遅 發 疼緩。故痛。未 易 久。以之 热不京左半身 外勢不可り 疹筋心仁。滯 急 如 終o 此 既 半 過の抜い刺 或 其 破中身

一座成年朝京夜熟氣急半年服藥不應及一一座成年朝京夜熱氣急半年服藥不應及一个好疼痛不能晚仰咳嗽吐痰飲食減少成勞那不足之症掉舟迎余脈不見弦數而微細時有做心丹參橘紅赤芍玄胡索澤蘭山查角制室、心母參橘紅赤芍玄胡索澤蘭山查角制室、心母參橘紅赤芍玄胡索澤蘭山查角制室、心母參橘紅赤芍玄胡索澤蘭山查角制室、心母參橘紅赤芍玄胡索澤蘭山查角制室、心母參橘紅赤芍玄胡索澤蘭山查角制室、心母學橘紅赤芍玄胡索澤蘭山查角制室、 不合之處檢其亦筋相不合之處檢其亦筋視和 加利之用桃仁 班也

人有內傷和無外感外感之症不獨風寒即夏月暑如外感然則內傷者本病外感者標病故傷寒集中如外感然則內傷者本病外感者標病故傷寒集中有內傷和無外感之症此之氣一受於身亦為,是先來,與人有內傷。 タ用 曹洪宇子之 驗 補 中益氣影朝凉夜熱俱愈 外城爭奪家在涉訟公庭有老

定 兩 情。介 痧 **一方即於青** 二十 俱 戚 餘 北地 皮島 此供愈但其舊有不口以易藥獨活治其內京 淶 庙中 但其舊有不 - 取樂用 三 桃 足 傷。仁 之服亦 痰 脹 命。不 來 兼 問症 水冷 王胸 在 见中 展 化 是 保 命 更 服 7 關 亚

又有發為紫血疱者此真那之異者也無知那症變異更有難盡逃者即若為無如死症變異更有難盡逃者即若為於症不內攻則外清余於發蒙論中已 涖 例 其餘發 可後青來用參送大補乃健而隔 躼 腹亦服發出兩腿足紫血利如余降許秀芝女嫁為養媳婦手 治 王衡書 版 日也合放記之以 一已略陳其統 足下半身俱 膧o

华 學 一劑温服 **殿灣方知**。 與俱歸求 ランドナー **於其**脈三 有爽喘氣急而膨脹因之先治其態後治其変烈 疾喘氣急恋 人也中 1人紫 木 一,然而愈盡收曆結亦而愈紅花澤蘭桃仁島樂枯梗川芎 血疱盡收勝結 工工 九有彩筋發現於

哎 血ご便 冶 急 通过有 無令宛為本病之助先 小或白色 者薬 食 或 利に 兼 結 血。便 和 训 為本病之助先有症患病毒炎 中原縣 氣急者為者為者為為者為為有寒恐有寒恐有寒恐有寒恐有寒恐有寒恐有寒喘氣急者為為為者為 改其積極在一种疾喘氣急者急者急者為 改其積極在一种疾喘氣急者為為為者為 沒其積極有 脹 痰, **火** 壞 瘀 氣。 痧 有 喘氣 瓢 急 膱 有 瘀 有 者。不 痧 血炭滞。扇下腺 兼清熟品 念固之 腑c幅 有 大便 不の値

香用而余。— 痛加 費道元十 不已延 % 系念。 余。 左 部 頭 湯。服。余 脹 延

形 **痊**。服 彼 一 問 舊。兄 脉脹 之。痛。錢俱余族 又延公府 和 於 和 称。 **拠**風 净压 緊衝 和痧。而書 即 利利下出紫黑海 數右三部脈如鄉 一種木湯加工厂 一月晚 稍毒無。 分。不 氣 微愈急の 温用餐 服之 首 病稍腹 急脉也 脹復其

驗。服。錢。方。此 溪。者 血源 肉o者。 老若牛錢。者。犯毒表。為者余勝黃為大之留氣 所於三苓之麻氣。於所治此錢。一放瘟變經感 有症。苦錢癌症。為絡。發然。因發五三眉大以而 四 分。次。髮 濕。成 天 等 發。皂 日 俱 尚 瀛 瀛 新 治 生 角 此一脱。何 症。 恭 錢。皂日俱尚 瀛 瀛。 之。及。地刺痧面疑最以不二一瘋目平。惡 放 钱。钱。也。頽、余·候 水 赤 傳 败。告 为五千在若遲 治日

服之即亦 遵湯一碗 者消經勢 解血凶毒肉素。 徧 腹 為之未 身大 先初身重。 痛∘痛∘ 易重若 I III 治病。飲 脹 噦 身酸水。 久不熟 則能 不能以為 推 轉 熱 治の側の酒の 放 汝 疹 · 称 恋

也。余。看一恋。用 服桃 刺右身莫 眼 E 胍 脈 血 虚·轉 頭 愈·微 九 左 侧,痛 温 胍 服。川 針。寸 卧 袋 沃出 少领床熟。 愈。細。不胸 孫毒之 關起。中 用 一下七 消洪服脹 刻 夢 1 to 10 to 1 氟 活 有藥。飲 们 澌 血力。益熱 必 减。飲 知昏湯 解 又放 묧 其 沉。一 藥症 延 碗。

之會火煩然陰遊形 劑。穴。勢 悶 他肝衝。者引 引者目。不目。如患。症 火放車 知若 桃o今 適 之 為用治療患。珠君 良清宜毒必突不火 法。火先已然出。受相 活刺 泰先 最那。合。 遊陽覺為遊故 TH. 頁位心內的犯 脸 順 氣百其中 脸·厥毒

寒! 愈延用介 滕 加 夢又者於 愈。石 不斜草决明加重便後冷飲之此味不於,就為眼珠掛出左目尤甚至地忽然一次。 在 到 那 那 出 在 目 尤 也 至 吃 是 在 道 就 患 心 中 煩熱 頭 眩 忽 兩 目 紅 在 道 誠 患 心 中 煩熱 頭 眩 忽 兩 目 紅 下熱傷感疑滞 次肌膚血肉之 长十 め之間。 至 膚血 山肉之中至秋下 一套變為鬼症 為將即 珠丹 紅 始皮也。野

想或變下痢, 其寒熱建四 有發源 之水温 洪公震 驗 派 亦 胛 食 月惡寒後热此 然後不順題。少。然後看 解清

飲饭 用 热刺 血の次 消 0 微大公 用 筋。 脂 基 延 為 害 也。血 不能之 用 下温頭 + 醒○敬 制 加 面理指錢。明 益 二微绺 也。腫而 児 脹の痊の十 · 十 後 二 沉 脈 二 飲 分·重·沉 恋 心 針·之·飲 去少之·談 毒愈·又飲 胸 愈o 煩 間の

頭痛心煩不安宜利心感氣慢者上升於三四 微 服和 緊。次 如所宣化飲之二股人 如前面 一勝頭面常覺頭臨內熱 一陽頭面常覺頭臨內熱 不熟如應心腹口服全愈 之。出

● 大学● 大学</l 喘而 翋 漸益甚或時右 泉而炎 ※ 企の余い 派

涌 然北 痛 "又止來去不常 而足痛止次日 張宏原內室目!" 治能後流不非驗有憑及已。流 痛 左 閒 ·無一定 足小腿 左足小 延余診之足延倉種 氣 現。病 極 開。刺 勢 難 分 之 氣 現。病 六 大 痛。 脈 痛心暮 而即 治無暴。或 腹腹

|刺痧退服/ 乍 松中 版紅花湯半月題 與併刺鎭頂一針 來 一組題大 隆生以為流火使 俱 痊の湯の

在該其脈厥厥動搖數而又疾余日脈異於常了 症多變殆其症與不信服熱湯二日而殂 一奚敬峰晚間右大腿紅腫痛方已喉旁發腫而 一奚敬峰晚間右大腿紅腫痛方已喉旁發腫而 此者多細看兩臂症筋刺出毒血如注診氣口脈 此者多細看兩臂症筋刺出毒血如注診氣口脈 一食消便下而安 彩毒之氣上凌肺金弦無逆發焓而咳嗽痰涎上咳嗽 喧燉痧

者必有痧筋然後刺之臨症用藥宜理於 無分痧筋往往不現治以刮痧為主間 與傷風咳嗽治之則假矣 原是知其為亦之變症也到亦記用的原門運延他屬照傷風疾嗽之藥四面目浮煙延他屬照傷風疾嗽之藥四面目浮煙延他屬照傷風疾嗽之藥四面目浮煙延他屬照傷風疾嗽之藥四個神嘉長女五月發熱咳嗽嘔吐痰涎 版 腫或心 到那記·斯 余偶過求 旦理珍毒為主若生間有入於血分類則此熱毒入於 水介診之右 水砂削心中 水砂削中服

湯加貝母薄荷童便做冷飲之即痊 卷中